

SB4
Vp 175 cfo
Cv01

Paracodina®



Comprimidos

Antitussígeno

Lic. pelo S. N. F. M. F. sob n.º 565/40
Farm. resp. : Prof. Jayme Cruz - CRF 7 n.º 346

COMPOSIÇÃO :

Paracodina é dihidrocodeína. 1 comprimido contém 0,01 g de bitartarato de Paracodina.

DADOS CLÍNICOS :

Paracodina é superior à codeína. Apresenta ação antitussígena mais energética, início de ação mais rápido e efeito mais prolongado. Paracodina ainda exerce ação antitussígena naqueles casos de ação ineficiente da codeína. Em doses clínicas não deprime o centro respiratório e apresenta reduzidos efeitos colaterais como sonolência e constipação.

A ação analgésica de Paracodina é de 2 a 3 vezes superior a da codeína, especialmente útil nos pacientes com tosse acompanhada de dores do trato respiratório.

INDICAÇÕES :

Tosses e irritação tussígena de qualquer etiologia, especialmente nas afecções inflamatórias do trato respiratório. Paracodina mostra sua ação especialmente nas seguintes indicações : bronquite, coqueluche, traqueíte, faringite, laringite, assim como tosse do enfisema, tuberculose pulmonar ou tosse por mecanismo reflexo.

POSOLOGIA :

Adultos recebem em média 1-3 comprimidos 3 vezes ao dia. Na maioria dos casos são suficientes doses reduzidas; por outro lado, é possível administrar sem reserva 0,05 g por dose.

Crianças de 2 a 5 anos recebem $\frac{1}{4}$ - $\frac{1}{2}$ comprimido; de 6 a 12 anos $\frac{1}{2}$ -1 comprimido, 1-2-3 vezes ao dia.

Em crianças e pessoas de paladar delicado é preferível a administração de Xarope de Paracodina.

Venda sob prescrição médica

APRESENTAÇÃO :

Vidro com 20 comprimidos

OUTRAS APRESENTAÇÕES :

Vidro com 125 ml (xarope)

Vidro com 10 ml (solução)

Fabricado pela

KNOLL S. A.

(Produtos Químicos e Farmacêuticos)

Rua Maxwell, 10

Rio de Janeiro — Estado da Guanabara

C.G.C. 33.258.450/0001-38

Com autorização de

KNOLL A.-G.

Ludwigshafen/Reno — Alemanha

Indústria Brasileira